

DOTYCZY:

OCHRONY PERSONELU STACJI DIALIZ PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2 ORAZ LECZENIA DIALIZAMI OSÓB Z COVID-19.

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA

1. Edukacja pacjentów:

- poinformować pacjentów o konieczności unikania miejsc zatłoczonych: urzędów, sklepów, centrów handlowych itp.
- unikanie dotykania wszelkich powierzchni i własnej twarzy,
- częste mycie rąk wodą i mydłem oraz dezynfekcja rąk preparatami na bazie alkoholu,
- konieczność mierzenia temperatury przez pacjentów w domu oraz zgłaszanie objawów kaszlu i duszności przy pierwszym kontakcie personelowi Stacji Dializ lub zespołowi transportującemu lub telefonicznie w miarę możliwości.

2. Poinformować zespoły transportujące o konieczności wzmożonej obserwacji przewożonych pacjentów.

3. Przyjęcie każdego pacjenta na Stacji Dializ powinno być poprzedzone wstępną oceną stanu pacjenta przez pielęgniarkę zabezpieczoną w środki ochrony indywidualnej (maska, okulary ochronne, fartuch, rękawice):

- pacjent podejrzany z wysoką gorączką, powinien zostać niezwłocznie odseparowany od pozostałych pacjentów do wyznaczonego w placówce miejsca: pomieszczenie wyznaczone do tego celu,
- wyposażyć pacjenta w maseczkę typu FFP3, FFP2, N95, maseczka chirurgiczna, (jeśli pacjent jest wydolny oddechowo),
- jeśli w wyniku wstępnego badania i oceny stanu klinicznego zapadnie decyzja o odroczeniu dializy oraz transporcie do szpitala zakaźnego, należy wezwać dedykowany transport sanitarny,
- zebranie odpowiedniego wywiadu od pacjenta- lekarz dyżurny,

- do lekarza dyżurnego należy zorganizowanie transportu przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala zakaźnego lub szpitala dysponującego oddziałem zakaźnym, po uprzednim uzgodnieniu przekazania pacjenta,
- wydelegować osobę/osoby do opieki nad pacjentem do czasu przekazania pacjenta do szpitala zakaźnego,
- sprzęt dedykowany dla pacjenta a następnie poddany dekontaminacji,
- obowiązuje ścisłe przestrzeganie procedur medycznych,

4. Jeśli leczenie nerkozastępcze pacjenta w okresie kwarantanny nie jest możliwe w szpitalu zakaźnym, należy zapewnić je w ośrodku dializ w warunkach izolacji i odpowiednio zabezpieczyć przed zakażeniem zarówno personel jak i pacjentów:

- przestrzegać zaleceń,
- przeprowadzić zabieg pod nieobecność innych pacjentów np. w godzinach nocnych (izolacja czasowa) lub w izolowanym pomieszczeniu (izolacja przestrzenna),
- dedykować pacjentowi personel,
- zminimalizować czas pobytu pacjenta w ośrodku przed i po zabiegu,
- zabezpieczyć środkami ochrony osobistej pacjenta i personel przebywający w tym samym pomieszczeniu,

5. Po wykonaniu zabiegu u pacjenta z COVID-19, salę oraz sprzęt medyczny należy poddać dekontaminacji środkami o szerokim spektrum działania stosowanymi w Stacji Dializ.

6. Należy monitorować objawy u personelu medycznego i pozostałych pacjentów.

7. Pozostawać w ciągłym kontakcie z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.